

## بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز ADR، بیش از ۵۰٪ عوارض به ثبت رسیده در این مرکز ناشی از مصرف داروهای تزریقی بوده است.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد ارسالی به این مرکز، عوارض گزارش شده قابل پیشگیری بوده است، توجه همکاران محترم را به نکات ذیل جلب می نماید:

اثر بخشی داروهای تزریقی لزوماً بیشتر از داروهای خوراکی نیست، لذا در مواردی که امکان استفاده از اشکال غیر تزریقی داروها وجود دارد، از تجویز فرآورده های تزریقی اجتناب نمایید.

نتایج بررسی های انجام شده در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آذربایجان در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که بیشترین سهم از ارقام تجویزی را داروهای تزریقی به خود اختصاص داده اند.

عنوان شکل دارویی	درصد قیمت از مجموع ارقام	درصد از ارقام تجویزی	درصد بیمار دریافت کننده
تزریقی	۲۶-۵۶%	۳۱-۸۳%	۵۷-۸۴%
خوراکی قرص	۳۳-۰۴%	۲۹-۵۵%	۵۷-۶۳%
خوراکی شربت	۱۴-۵۵%	۱۹-۰۲%	۳۸-۱۸%
خوارکی کپسول	۱۳-۶۹%	۷-۶۸%	۲۴-۲۵%
موضعی	۴-۱۰%	۶-۳۸%	۱۷-۱۴%
رکتال و واژینال	۱-۹۶%	۲-۳۰%	۷-۶۵%
خوراکی سایر	۲-۱۳%	۲-۲۹%	۶-۹۰%

این در حالی است که بجز در موارد استثنا، هیچ یافته قطعی مبنی بر ارجحیت روش تزریقی بر مصرف خوراکی داروها وجود ندارد.



در هنگام تجویز داروهای تزریقی توجه فرمایید که تجویز تنها در زمانهایی که اثر سریع درمانی ضروری است، یا بیمار قادر به مصرف داروهای خوراکی نیست، یا مواردی که دارو در صورت مصرف از راه خوراکی از بین رفته و بی اثر میشود و یا از دستگاه گوارش قابل جذب نمی باشد صورت پذیرد.